

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta. Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek SULPHODENT ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

- Należy zachować tę ulotkę aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilają się lub nie ustąpią po 10-15 dniach u dorosłych należy skonsultować się z lekarzem.

SULPHODENT 370mg/g

(360mg/g woda chlorkowo-sodowa (solanka) siarczkowa, jodkowa
+10mg/g bocheńska lecznicza sól jodkowo-bromowa)

Pasta do zębów

Skład:

W 100,0g produktu leczniczego znajduje się:

substancja czynna: woda siarczkowo-siarkowodorowa słona 36g
oraz sól mineralna 1g;

substancje pomocnicze: krzemionka - 28g, glicerol 86% - 23g, guma ksantanowa - 0,7g, olejek mięty pieprzowej - 0,7g, siarczan laurylo-sodowy - 0,8g, sorbitol - 7,2g, metylu hydroksybenzoetan - 0,1g, dwutlenek tytanu - 1,5g, sacharoza - 1g

Opakowanie:

Tuba aluminiowa zawierająca 60,0g pasty Sulphodent, umieszczona w kartoniku z ulotką informacyjną.

Podmiot odpowiedzialny:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Sulphur Zdrój Exim”
28-100 Busko- Zdrój, ul. Rokosza 18, tel/fax 0-41 378-48-88;

Miejsce wytwarzania:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Sulphur Zdrój Exim” Zakład Produkcyjny
28-100 Busko- Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 116a, tel/fax 0-41 378-78-93.

Spis treści ulotki:

- 1.Co to jest lek Sulphodent i w jakim celu się go stosuje
- 2.Zanim zastosuje się lek Sulphodent
- 3.Jak stosować lek Sulphodent
- 4.Możliwe działania niepożądane
- 5.Przechowywanie leku Sulphodent
- 6.Inne informacje dotyczące leku Sulphodent

1. Co to jest lek Sulphodent i w jakim celu się go stosuje

Mineralna pasta do zębów Sulphodent zawiera w swoim składzie aktywne biologicznie związki siarki S^{2-} , HS^- oraz jony Cl^- , K^+ , Na^+ , Mg^{2+} , Ca^{2+} , HCO_3^- , J^- , Br^- . Zawarty w paście chlorek sodowy wykazuje działanie antyseptyczne, działa pobudzająco na błonę śluzową i zwiększa wydzielanie śliny. Mineralne składniki pasty działają

ściągająco i przeciwzapalnie, wpływają na odnowę i regenerację nabłonka śluzówki jamy ustnej.

Stosowanie pasty zmniejsza krwawienia i obrzęk brodawek dziąsłowych, obniża ilość wydzielanego płynu z kieszonek dziąsłowych i zmniejsza głębokość patologicznych kieszonek dziąsłowych.

Nie zaostrza procesu zapalnego w przyzębiu.

Wskazania:

- zapalenie przyzębia (tzw. paradontoza)
- zapalenie dziąseł
- profilaktyka chorób przyzębia

2. Zanim zastosuje się lek Sulphodent:

Leku nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku w tym metylu hydroksybenzoetan.

Nie zaleca się stosowania u małych dzieci i w ropnych stanach zapalnych przyzębia. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Ciąża - Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży.

Karmienie piersią - Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku w okresie karmienia.

Stosowanie innych leków - Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych które wydawane są bez recepty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn - Sulphodent pasta do zębów jest uważana za bezpieczną i nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

3.Jak stosować lek Sulphodent?

2-3 razy dziennie myć zęby pastą i lekko masować dziąsła miękką szczoteczką do zębów przez około 2-3 minuty. Po umyciu dokładnie wypłukać.

4.Możliwe działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek Sulphodent może powodować działania niepożądane.

Nie stwierdzono działań ubocznych ani zaostrzeń objawów choroby. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych należy poinformować o nich lekarza.

5.Przechowywanie:

Mineralną pastę do zębów Sulphodent należy przechowywać w temp. do 25°C w szczelnie zamkniętym opakowaniu w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie należy stosować pasty Sulphodent po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.Inne informacje:

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Polska

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Sulphur Zdrój Exim”

28-100 Busko- Zdrój, ul. Rokosza 18,

tel/fax 0-41 378-78-93; 0-41 378-48-88;

Data opracowania ulotki: 10.12.2008