

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.

Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek HOMEOPLASMINE® maść ostrożnie.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują należy skontaktować się z lekarzem.

HOMEOPLASMINE® maść

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Skład

100 g maści zawiera:

Substancje czynne leku:

Calendula officinalis	TM 0.1 g
Phytolacca decandra	TM 0.3 g
Bryonia dioica	TM 0.1 g
Benzoe	TM 0.1 g
Acidum boricum	4.0 g

Substancje pomocnicze: wazelina biała.

Zawartość w opakowaniu: 18 lub 40 g.

Podmiot odpowiedzialny

BOIRON SA

20, rue de la Libération

69110 Ste-Foy-lès-Lyon

Francja

Wytwórca

BOIRON SA

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Francja

Spis treści ulotki :

- 1.Co to jest lek HOMEOPPLASMINE[®] maść i w jakim celu się go stosuje?
- 2.Informacje ważne przed zastosowaniem leku HOMEOPPLASMINE[®] maść.
- 3.Jak stosować lek HOMEOPPLASMINE[®] maść?
- 4.Możliwe działania niepożądane.
- 5.Jak przechowywać lek HOMEOPPLASMINE[®] maść?
- 6.Inne informacje.

1.Co to jest lek HOMEOPPLASMINE[®] maść i w jakim celu się go stosuje?

HOMEOPPLASMINE[®] maść jest lekiem o działaniu antyseptycznym i gojącym stosowanym w przypadkach podrażnień skóry takich jak: niewielkie zranienia, zadrapania, otarcia naskórka, skaleczenia, pęknięcia skóry.

2.Informacje ważne przed zastosowaniem leku HOMEOPPLASMINE[®] maść.

Kiedy nie stosować leku HOMEOPPLASMINE[®] maść

Leku HOMEOPPLASMINE[®] maść nie należy stosować jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie(nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Ze względu na obecność kwasu borowego nie należy stosować maści u dzieci ani na skaleczenia zainfekowane. Nie stosować na błony śluzowe.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek HOMEOPPLASMINE[®] maść

Nie dotyczy.

Stosowanie leku HOMEOPPLASMINE® maść z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku HOMEOPPLASMINE® maść z jedzeniem i piciem

Nie dotyczy.

Ciąża i karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku HOMEOPPLASMINE® maść u kobiet w ciąży.

Nie stosować w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie dotyczy

Ważne informacje o niektórych składnikach leku HOMEOPPLASMINE® maść

Ze względu na obecność w składzie kwasu borowego, nie należy stosować maści na duże powierzchnie skóry lub na otwarte rany (przede wszystkim na oparzenia) ani do opatrunków ochronnych.

Jeśli objawy nie ustępują lub nasilają się po upływie 4 dni od momentu zastosowania leku oraz w przypadku pojawienia się zaczerwienienia naskórka, należy zaprzestać stosowania maści i zasięgnąć porady lekarza.

3. Jak stosować lek HOMEOPPLASMINE® maść?

Stosować na skórę.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowane dawkowanie leku HOMEOPPLASMINE® maść to:

Dorośli: niewielką ilość maści nanosić 1-3 razy dziennie na oczyszczoną powierzchnię zranionej skóry.

Maści nie należy stosować dłużej niż 1 tydzień.

Zastosowanie większej niż zalecana ilości leku HOMEOPLASMINE[®] maść

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku HOMEOPLASMINE[®] maść

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku HOMEOPLASMINE[®] maść

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane.

Jak każdy lek, HOMEOPLASMINE[®] maść, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, należy zaprzestać stosowania leku i powiadomić lekarza lub farmaceutę.

U noworodków i małych dzieci kwas borowy wywoływał poważne działania niepożądane. Objawy skórne (rozległe i nasilone zaczerwienienie skóry, złuszczenie z początkowym rumieniem, występującym zwłaszcza na poziomie pośladków lub ust) wymagają konsultacji z lekarzem.

5. Jak przechowywać lek HOMEOPLASMINE[®] maść?

Przechowywać temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Nie stosować dłużej niż 1 rok po pierwszym otwarciu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku HOMEOPLASMINE[®] maść po upływie terminu ważności umieszczonego na kartoniku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6. Inne informacje.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Boiron Sp. z o.o.

ul. Raszyńska 13

05-500 Piaseczno

Tel.: 022/702 66 70

Fax: 022/702 66 71

e-mail: informacjaoleku@boiron.pl

Data zatwierdzenia ulotki: 10/2009