

Acard 75 mg x 60 tabl



Cena: 9,19 PLN

Opis słownikowy

Postać	Tabletki
Producent	POLFA WARSZAWA
Promocje	Wybór Farmaceuty
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Acidum acetylsalicylicum

Opis produktu

Skład

Substancja czynna: kwas acetylosalicylowy 75 mg

Wskazania i działanie

- choroba niedokrwienności serca
- zapobieganie zawałowi serca u osób dużego ryzyka
- w niestabilnej chorobie wieńcowej
- u osób po przebytych już zawałach
- stan po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych
- zapobieganie zatorom naczyń mózgowych u osób z migotaniem przedsionków
- u osób po przebytych udarach zatorowym mózgu oraz z zarostową miażdżycą tętnic obwodowych

Acard hamuje agregację płytek krwi. Specjalnie skonstruowana otoczka powoduje, że tabletki rozpadają się dopiero w jelicie cienkim, co pozwala ochronić śluzówkę żołądka i dwunastnicy przed podrażnieniem.

Dawkowanie

1 lub 2 tabletki 1-2 razy na dobę lub co drugi dzień w czasie posiłku. Jeśli konieczne jest szybkie działanie antyagregacyjne, celowe jest rozpoczęcie leczenia od 300 mg dziennie przez 2 dni, a następnie zmniejszenie dawki do wartości 75-150 mg. Tabletki należy połykać w całości, nie rozgryzać.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na pochodne kwasu salicylowego, uczulenie na inne niesteroidowe leki p/zapalne (astma aspirynowa). Nie należy stosować u dzieci poniżej 15 roku życia chorych na zakażenia wirusowe, z uwagi na podejrzenie o powodowanie zespołu Rey'a. Leku nie należy stosować w trakcie ciąży, jak też w chorobie wrzodowej. Przeciwwskazaniem jest także skaza krwotoczna, hemofilia, polipy nosa oraz trombocytopenia.

