

Ambrosol Teva 15mg/5ml syrop 120 ml



Cena: 10,15 PLN

Opis słownikowy

Postać	Syropy
Producent	TEVA KUTNO
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Ambroxolum

Opis produktu

Skład

Substancja czynna: Ambroxoli hydrochloridum 0,3 g, basis corrigentia et conservans ad 100,0 ml.

Wskazania i działanie

- Ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych połączone z nieprawidłową sekrecją wydzieliny oskrzelowej jak np: mukowiscydoza (cystic ffcrosis), przewlekłe zapalenie oskrzeli, obturacyjne zapalenie oskrzeli, dychawica oskrzelowa (astma), stany zapalne nosogardzieli
- Pomocniczo w okresie przed- i pooperacyjnym podczas stosowania intensywnej terapii oddechowej.

Preparat posiada właściwości mukolityczne. Powoduje rozrzedzenie śluzu, ułatwia usuwanie gęstej wydzieliny z dróg oddechowych. Dzięki swym właściwościom ułatwia odkrztuszanie plwociny, znacznie poprawia oddychanie i w przebiegu leczenia prowadzi do normalizacji śluzu. Często zmniejsza się wyraźnie kaszel i objętość odkrztuszonej plwociny. Ze względu na dobrą tolerancję może być stosowany długotrwale.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: Początkowo, przez 2 do 3 dni leczenia - 30 mg (5 ml, czyli 1 łyżeczka miarowa) 3 razy na dobę; następnie dawkę należy zmniejszyć do 30 mg (5 ml) 2 razy na dobę. Dzieci w wieku do lat 12: Jeżeli lekarz nie zaleci specjalnego dawkowania, syrop Ambrosol 30 mg/5 ml stosuje się u dzieci następująco: Dzieci od 1 do 2 lat 7,5 mg (1,25 ml, czyli 1/4 łyżeczki miarowej) 2 razy na dobę. Dzieci od 2 do 6 lat 7,5 mg (1,25 ml, czyli 1/4 łyżeczki miarowej) 3 razy na dobę. Dzieci od 6 do 12 lat 15 mg (2,5 ml, czyli 1/2 łyżeczki miarowej) 2 do 3 razy na dobę.

Przeciwwskazania

Stwierdzona nadwrażliwość na jakikolwiek ze składników, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy oraz nadkwaśność. Preparat należy ostrożnie stosować w okresie ciąży i karmienia. Nie stosować z lekami przeciwkaszlowymi.

Więcej informacji znajduje się w ulotce dostępnej w zakładce Załączniki.

