Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
ul. Ząbkowska 41, 03-736 Warszawa
REGON: 015249601

SPRAWDZONO POD
WZGLĘDEM
MERYTORYCZNYM
1 SIE. 2009



Ulotka dla pacjenta

**Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.**
Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Cralonin i zgodnie z informacją w ulotce.
- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli objawy choroby nie ustąpią lub nasilą się.

# Cralonin
## krople doustne, roztwór

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

**Skład:**
100 g kropli zawiera:
Substancje czynne: Crataegus TM 70,0 ml, Spigelia anthelmia D2 1,0 ml, Kalium carbonicum D3 1,0 ml.

Substancje pomocnicze: woda oczyszczona, etanol.

Zawiera 45% (v/v) etanolu.

**Zawartość leku w opakowaniu:** 30 ml lub 100 ml.

**Podmiot odpowiedzialny:**
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg- Str. 2-4,
76532 Baden-Baden, Niemcy

**Spis treści ulotki:**
1. **Co to jest lek Cralonin i w jakim celu się go stosuje**
2. **Zanim zastosuje się lek Cralonin**
3. **Jak stosować lek Cralonin**
4. **Możliwe działania niepożądane**
5. **Przechowywanie leku Cralonin**
6. **Inne konieczne informacje dotyczące leku Cralonin**

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
ul. Ząbkowska 41, 03-736 Warszawa
REGON: 015249501

## 1. Co to jest lek Cralonin i w jakim celu się go stosuje

Cralonin, krople doustne jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagająco w łagodnych dolegliwościach sercowych o podłożu nerwowym.

Uwaga:
Jeżeli objawy nasilą się, nie ustąpią lub pojawią się nowe objawy, należy zasięgnąć porady lekarskiej.

## 2. Zanim zastosuje się lek Cralonin

Lek zawiera 45% (v/v) etanolu (alkoholu), co stanowi 180 mg/dawkę (10 kropli). Jest to równoważne 3,6 ml piwa lub 1,5 ml wina. (Jako przelicznik przyjęto piwo zawierające 5% alkoholu oraz wino zawierające 12% alkoholu). Szkodliwy dla osób uzależnionych od alkoholu. Należy zachować ostrożność w przypadku osób z chorobami wątroby lub padaczką.

**Stosowanie leku Cralonin u dzieci:**
Produkt nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.

**Ciąża i karmienie piersią:**
Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania w czasie ciąży i karmienia piersią.

**Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu:**
Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

**Stosowanie innych leków:**
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane były bez recepty.
Interakcje z innymi lekami nie są znane.

## 3. Jak stosować lek Cralonin

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat dawkowania:

Dorośli: zwykle po 10 kropli 3 razy dziennie. Krople można zmieszać z niewielką ilością wody. Produkt przeznaczony jedynie do stosowania doraźnego.

Lek należy przyjmować pomiędzy posiłkami.
Nie przekraczać zaleconej dawki.

**W przypadku zażycia większej dawki leku Cralonin niż zalecana:**
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

**W przypadku pominięcia dawki leku Cralonin:**
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
ul. Ząbkowska 41, 03-736 Warszawa
REGON: 015249601

**4. Możliwe działania niepożądane**
Jak każdy lek, Cralonin krople doustne może powodować działania niepożądane.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy zaprzestać przyjmowania leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

**5. Przechowywanie leku Cralonin**
Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

**6. Inne informacje**
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Heel Polska Sp. z o.o.
ul. Poleczki 21
02-822 Warszawa
tel. 0 22 545 07 15

Logo firmy: **-Heel**

Data zatwierdzenia tekstu ulotki: *miesiąc/rok* 11.08.2009

Kod opakowania: