

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Diarrheel S ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli objawy choroby nie ustąpią lub nasilą się.

Diarrheel S tabletki

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Skład:

1 tabletka zawiera:

Substancje czynne: Argentum nitricum D8 30 mg, Acidum arsenicosum D8 30 mg, Colchicum autumnale D6 30 mg, Citrullus colocynthis D6 30 mg, Mercurius sublimatus corrosivus D8 30 mg, Podophyllum peltatum D6 30 mg, Veratrum album D4 30 mg.

Substancje pomocnicze: laktoza, stearynian magnezu.

Zawartość leku w opakowaniu: 50 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny:

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg -Str. 2-4,
76532 Baden-Baden, Niemcy

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Diarrheel S i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek Diarrheel S
3. Jak stosować lek Diarrheel S
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku Diarrheel S
6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Diarrheel S

1. Co to jest lek Diarrheel S i w jakim celu się go stosuje

Diarrheel S, tabletki jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagająco w leczeniu biegunek.

Uwaga:

Jeżeli w ciągu 1 dnia stosowania leku objawy nie ustąpią lub nasilą się, należy koniecznie zasięgnąć porady lekarskiej.

2. Zanim zastosuje się lek Diarrheel S

Lek zawiera laktozę. Pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Diarrheel S u dzieci:

Ze względu na brak wystarczająco udokumentowanych danych, nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat.

Ciąża:

Nie stosować w czasie ciąży.

Karmienie piersią:

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania w okresie karmienia piersią.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane były bez recepty.

Interakcje z innymi lekami nie są znane.

3. Jak stosować lek Diarrheel S

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat dawkowania:

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:

zwykle po 1 tabletkę 3 razy dziennie. Tabletkę należy powoli rozpuścić w ustach.

Lek należy przyjmować pomiędzy posiłkami.

Nie przekraczać zalecanej dawki.

W przypadku zażycia większej dawki leku Diarrheel S niż zalecana:

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Diarrheel S :

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Diarrheel S tabletki, może powodować działania niepożądane.

W przypadku wystąpienia ślinotoku należy zaprzestać podawania leku i powiadomić lekarza.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

5. Przechowywanie leku Diarrheel S

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Heel Polska Sp. z o. o.
ul. Poleczki 21,
02-822 Warszawa
tel. 022 545 07 15

Logo firmy: **-Heel**

Data zatwierdzenia tekstu ulotki:

04.12.2008

Kod opakowania: