ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

PARACETAMOL HASCO
500 mg, tabletki powlekane
(*Paracetamolum*)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Paracetamol Hasco ostrożnie.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach należy skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Paracetamol Hasco i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek Paracetamol Hasco
3. Jak stosować lek Paracetamol Hasco
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku Paracetamol Hasco
6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK PARACETAMOL HASCO I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Paracetamol Hasco to lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy do stosowania w następujących wskazaniach:
- bóle głowy;
- bóle gardła;
- migreny;
- bóle zębów;
- bóle kostne, stawowe i mięśniowe;
- bolesne miesiączkowanie (ze względu na działanie przeciwbólowe);
- przy przeziębieniach i stanach grypopodobnych (ze względu na działanie przeciwgorączkowe).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PARACETAMOL HASCO

Kiedy nie stosować leku Paracetamol Hasco
- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Paracetamol Hasco;
- jeśli u pacjenta występuje:
  - ciężka niewydolność wątroby lub wirusowe zapalenie wątroby,
  - ciężka niewydolność nerek,
  - choroba alkoholowa.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Paracetamol Hasco

Ze względu na ryzyko przedawkowania nie przyjmować leku Paracetamol Hasco jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol oraz nie stosować dawek większych niż zalecane.

Ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby, w czasie stosowania leku Paracetamol Hasco nie należy spożywać napojów alkoholowych oraz nie stosować leku Paracetamol Hasco u osób regularnie pijących alkohol oraz u osób długotrwale niedożywionych.

Stosować ostrożnie u osób:
- z niewydolnością wątroby,
- z niewydolnością nerek,
- z obniżoną aktywnością dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej,
- z obniżoną aktywnością reduktazy methemoglobinowej,
- chorych na astmę z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, ponieważ u mniej niż 5% pacjentów obserwowano skurcze oskrzeli po zastosowaniu paracetamolu.

Stosowanie leku Paracetamol Hasco u dzieci
Nie zaleca się stosowania leku Paracetamol Hasco u dzieci poniżej 6 lat.
Należy wówczas zastosować lek Paracetamol Hasco w postaci zawiesiny doustnej przeznaczony dla dzieci od 3 miesiąca życia.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku przyjmowania następujących leków: metoklopramid, domperidon (leki stosowane przeciw nudnościom i wymiotom), cholestyramina (lek obniżający zawartość cholesterolu we krwi), leki przeciwzakrzepowe (z grupy pochodnych kumaryny), w razie konieczności długotrwałego stosowania leku przeciwbólowego, leków nasennych lub przeciwpadaczkowych (m.in. glutetimidu, barbituranów i np. fenobarbitalu, fenytoiny, karbamazepiny), niektórych antybiotyków t.j. ryfampicyny i chloramfenikolu, leków przeciwdepresyjnych (z grupy tzw. inhibitorów MAO), alkoholu oraz tzw. niesteroidowych leków przeciwzapalnych (m. in. ibuprofenu, kwasu acetylosalicylowego).

Przyjmowanie paracetamolu jednocześnie z inhibitorami MAO (leki przeciwdepresyjne) może wywołać stan pobudzenia i wysoką temperaturę.

Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczania glukozy w osoczu krwi).

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Paracetamol nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK PARACETAMOL HASCO

Lek Paracetamol Hasco stosuje się doustnie.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:
2 tabletki, w razie konieczności do 4 razy na dobę.
Nie przyjmować leku częściej niż co 4 godziny. Nie przekraczać dawki maksymalnej do 8 tabletek na dobę.

Dzieci w wieku 6 – 12 lat:
0,5 - 1 tabletki, w razie konieczności do 4 razy na dobę.
Nie przyjmować leku częściej niż co 4 godziny. Nie przekraczać dawki maksymalnej do 4 tabletek na dobę.

Bez konsultacji z lekarzem leku nie należy stosować regularnie dłużej niż przez 3 dni.

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Paracetamol Hasco

Przedawkowanie paracetamolu może spowodować niewydolność wątroby lub nerek. W przypadku zażycia dawki większej niż zalecana należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej nawet, gdy samopoczucie chorego jest dobre.

Przypadkowe lub zamierzone przedawkowanie paracetamolu może spowodować w ciągu kilku, kilkunastu godzin takie objawy, jak: nudności, wymioty, nadmierne pocenie się, senność i ogólne osłabienie. W każdym przypadku przyjęcia paracetamolu w dawce 5 g lub wyższej, jeśli chory jest przytomny i od momentu przyjęcia paracetamolu nie minęła godzina, należy sprowokować wymioty i podać węgiel aktywowany (60 do 100 g zmieszane z wodą) oraz skontaktować się z lekarzem.

W przypadku pominięcia dawki leku Paracetamol Hasco
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Paracetamol Hasco może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (u mniej niż 1 na 1000 osób):
skórne reakcje uczuleniowe: pokrzywka, rumień, zapalenie skóry.

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 osób):
zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia), zmniejszenie liczby białych krwinek (leukopenia, agranulocytoza), nudności, wymioty, biegunka.

Lek stosowany przez dłuższy czas lub przedawkowany może spowodować uszkodzenie wątroby i nerek oraz methemoglobinemię z objawami sinicy (szaroniebieskie zabarwienie skóry).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PARACETAMOL HASCO

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Paracetamol Hasco po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Paracetamol Hasco
- Substancją czynną leku jest paracetamol. 1 tabletka zawiera 500 mg paracetamolu.
- Ponadto lek zawiera: skrobię kukurydzianą żelowaną, powidon (K-30), potasu sorbinian, magnezu stearynian oraz otoczkę tabletki (Opadry II 57U18539 White): hypromeloza, tytanu dwutlenek, polidekstroza, talk, maltodekstryna, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha.

Jak wygląda lek Paracetamol Hasco i co zawiera opakowanie
Lek Paracetamol Hasco to tabletki powlekane owalne, obustronnie wypukłe, gładkie, białe, bez zapachu.
Jedno opakowanie leku zawiera 6 lub 15 lub 30 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK" S.A.
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

tel. (71) 352 95 22
Informacja o Leku
tel. (22) 742 00 22

Data zatwierdzenia ulotki:

Podmiot odpowiedzialny
„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ
HASCO-LEK" S.A. 51-131 Wrocław ul. Żmigrodzka 242 E

Numer pozwolenia

Paracetamol Hasco

(Paracetamolum) 500 mg, tabletki powlekane

Lek przeznaczony do stosowania w następujących wskazaniach:

- **bóle głowy**
- **bóle gardła**
- **migreny**
- **bóle zębów**
- **bóle kostne, stawowe i mięśniowe**
- **bolesne miesiączkowanie**
- **przy przeziębieniach i stanach grypopodobnych**

6 tabletek powlekanych

Paracetamol Hasco
(Paracetamolum) 500 mg, tabletki powlekane
6 tabletek powlekanych

Warunki przechowywania Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C. Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Skład Jedna tabletka powlekana zawiera:
substancję czynną Paracetamol *(Paracetamolum)* 500 mg *i substancje pomocnicze.*

Sposób i droga podania Podawać doustnie w dawkach: Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 2 tabletki, do 4 razy na dobę. Nie częściej niż co 4 godziny oraz nie więcej niż do 8 tabletek na dobę. Dzieci w wieku 6 – 12 lat: ½ - 1 tabletki, do 4 razy na dobę. Nie częściej niż co 4 godziny oraz nie więcej niż do 4 tabletek na dobę.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku

Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. Ze względu na ryzyko przedawkowania nie przyjmować leku jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol. Bez konsultacji z lekarzem leku nie należy stosować regularnie dłużej niż przez 3 dni. W czasie stosowania paracetamolu nie należy spożywać napojów alkoholowych. Nie stosować leku u osób uzależnionych od alkoholu. U osób z astmą uczulonych na kwas salicylowy może wystąpić uczulenie na paracetamol.

0°C - 1 dk wydawany bez recepty

Numer serii (S)
Termin ważności (TW)

pole kodowania bez lakieru (9x29mm)

Paracetamol Hasco

(Paracetamolum) 500 mg, tabletki powlekane

Paracetamol Hasco

(Paracetamolum) 500 mg, tabletki powlekane

Lek przeznaczony do stosowania w następujących wskazaniach:

- **bóle głowy**
- **bóle gardła**
- **migreny**
- **bóle zębów**
- **bóle kostne, stawowe i mięśniowe**
- **bolesne miesiączkowanie**
- **przy przeziębieniach i stanach grypopodobnych**

15 tabletek powlekanych

Paracetamol Hasco

(Paracetamolum) 500 mg, tabletki powlekane

15 tabletek powlekanych

Wytwórca/Importer/Podmiot odpowiedzialny
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
51-131 Wrocław ul. Żmigrodzka 242 E

Numer pozwolenia

Paracetamol Hasco

(Paracetamolum) 500 mg, tabletki powlekane

Skład Jedna tabletka powlekana zawiera:

substancję czynną

Paracetamol *(Paracetamolum)* 500 mg

i substancje pomocnicze.

Sposób i droga podania Podawać doustnie w dawkach: Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 2 tabletki, do 4 razy na dobę. Nie częściej niż co 4 godziny oraz nie więcej niż 8 tabletek na dobę. Dzieci w wieku 6 – 12 lat: ½ - 1 tabletki, do 4 razy na dobę. Nie częściej niż co 4 godziny oraz nie więcej niż do 4 tabletek na dobę.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

OTC - Lek wydawany bez recepty.

Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. Ze względu na ryzyko przedawkowania nie przyjmować leku jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol. Bez konsultacji z lekarzem leku nie należy stosować regularnie dłużej niż przez 3 dni. W czasie stosowania paracetamolu nie należy spożywać napojów alkoholowych. Nie stosować leku u osób uzależnionych od alkoholu. U osób z astmą uczulonych na kwas salicylowy może wystąpić uczulenie na paracetamol.

Warunki przechowywania Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C. Lek przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Termin ważności (Tw)

Numer serii (S)

pole kodowania bez lakieru (32x10 mm)

Paracetamol Hasco

(Paracetamolum) 500 mg, tabletki powlekane

Paracetamol Hasco

(Paracetamolum) 500 mg, tabletki powlekane

Lek przeznaczony do stosowania w następujących wskazaniach:

- **bóle głowy**
- **bóle gardła**
- **migreny**
- **bóle zębów**
- **bóle kostne, stawowe i mięśniowe**
- **bolesne miesiączkowanie**
- **przy przeziębieniach i stanach grypopodobnych**

30 tabletek powlekanych

Podmiot odpowiedzialny
„PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK" S.A.
51-131 Wrocław ul. Żmigrodzka 242 E

Numer pozwolenia

Paracetamol Hasco

(Paracetamolum) 500 mg, tabletki powlekane

30 tabletek powlekanych

Paracetamol Hasco

(Paracetamolum) 500 mg, tabletki powlekane

Skład Jedna tabletka powlekana zawiera:
substancję czynną
Paracetamol *(Paracetamolum)* 500 mg
i substancje pomocnicze.

Sposób i droga podania Podawać doustnie w dawkach: Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 2 tabletki, do 4 razy na dobę. Nie częściej niż co 4 godziny oraz nie więcej niż do 8 tabletek na dobę. Dzieci w wieku 6 – 12 lat: ½ - 1 tabletki, do 4 razy na dobę. Nie częściej niż co 4 godziny oraz nie więcej niż do 4 tabletek na dobę.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

OTC - Lek wydawany bez recepty.

Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. Ze względu na ryzyko przedawkowania nie przyjmować leku jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol. Bez konsultacji z lekarzem leku nie należy stosować regularnie dłużej niż przez 3 dni. W czasie stosowania paracetamolu nie należy spożywać napojów alkoholowych. Nie stosować leku u osób uzależnionych od alkoholu. U osób z astmą uczulonych na kwas salicylowy może wystąpić uczulenie na paracetamol.

Warunki przechowywania Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C. Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Numer serii (S)

Termin ważności (Tw)

acetamol Hasco
amolum) 500 mg, tabletki powlekane

Paracetamol Hasco
(Paracetamolum) 500 mg, tabletki powlekane

o
ne

Paracetamol Hasco
(Paracetamolum) 500 mg, tabletki powlekane

Paracetamo
(Paracetamolum) 500 mg, t

etamol Hasco
lum) 500 mg, tabletki powlekane

Paracetamol Hasco
(Paracetamolum) 500 mg, tabletki powlekane

Paracetamol Hasco
(Paracetamolum) 500 mg, tabletki powlekane

Paracetamol I
(Paracetamolum) 500 mg, tablet

amol Hasco
00 mg, tabletki powlekane

Paracetamol Hasco
(Paracetamolum) 500 mg, tabletki powlekane

P.
(Pa

Paracetamol Hasco
(Paracetamolum) 500 mg, tabletki powlekane

Paracetamol Ha
(Paracetamolum) 500 mg, tabletki p

(Paracetamolum) 500 mg, tabletki powlekane

(Paracetamolum) 500 mg, tabletki powlek

ol Hasco

, tabletki powlekane

Paracetamol Hasco

(Paracetamolum) 500 mg, tabletki powlekane

Parac

(Paracetamo

Paracetamol Hasco

(Paracetamolum) 500 mg, tabletki powlekane

Paracetamol Hasco

(Paracetamolum) 500 mg, tabletki powlekane

Hasco

tki powlekane

Paracetamol Hasco

(Paracetamolum) 500 mg, tabletki powlekane

Paracet

(Paracetamolum)

aracetamol Hasco

Paracetamol Hasco