

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy zażywać lek DROSETUX[®] syrop ostrożnie.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują należy skontaktować się z lekarzem.

DROSETUX[®] **syrop**

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Skład

150 ml syropu zawiera:

Substancje czynne:

Drosera	3CH
Arnica montana	3CH
Belladonna	3CH
Cina	3CH
Coccus cacti	3CH
Corallium rubrum	3CH
Cuprum gluconicum	3CH
Ferrum phosphoricum	3CH
Ipeca	3CH
Solidago virga aurea	1CH aa 15 ml

Substancje pomocnicze: benzoesan sodu, kwas cytrynowy jednowodny, woda oczyszczona, roztwór sacharozy.

Zawartość w opakowaniu: 150 ml.

Podmiot odpowiedzialny

BOIRON SA

20, rue de la Libération

69110 Ste-Foy-lès-Lyon

Francja

Wytwórca

BOIRON SA

2 avenue de l'Ouest Lyonnais,

69510 Messimy

Francja

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek DROSETUX[®] syrop i w jakim celu się go stosuje?
2. Informacje ważne przed zażyciem leku DROSETUX[®] syrop.
3. Jak zażywać lek DROSETUX[®] syrop?
4. Możliwe działania niepożądane.
5. Jak przechowywać lek DROSETUX[®] syrop?
6. Inne informacje.

1. Co to jest lek DROSETUX[®] syrop i w jakim celu się go stosuje?

DROSETUX[®] syrop jest lekiem stosowanym wspomagająco w leczeniu suchego i drażniącego kaszlu.

2. Informacje ważne przed zażyciem leku DROSETUX[®] syrop.

Kiedy nie zażywać leku DROSETUX[®] syrop ?

Leku DROSETUX[®] syrop nie należy zażywać, jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek DROSETUX[®] syrop ?

W przypadku utrzymującego się kaszlu, odkrztuszaniu ropnej płwociny, gorączki lub duszności należy skontaktować się z lekarzem. Przed zastosowaniem leku u dzieci poniżej 6 roku życia należy skonsultować się z lekarzem.

Zażywanie leku DROSETUX[®] syrop z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Zażywanie leku DROSETUX[®] syrop z jedzeniem i piciem

Brak specjalnych wymagań.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie dotyczy.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku DROSETUX[®] syrop

15 ml syropu zawiera 12.6 g sacharozy.

5 ml syropu zawiera 4.2 g sacharozy.

- Ze względu na zawartość sacharozy stosować ostrożnie u pacjentów z cukrzycą.
- W przypadku występowania nietolerancji węglowodanów należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. Jak zażywać lek DROSETUX[®] syrop?

Stosować doustnie.

w przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowane dawkowanie leku DROSETUX[®] syrop to:

Dorośli: 15 ml syropu, 3-5 razy dziennie.

Dzieci powyżej 6 roku życia: 5 ml syropu, 3-5 razy dziennie.

Dzieci poniżej 6 roku życia: wg wskazań lekarza.

Podczas stosowania leku zaleca się wykorzystanie miarki dozującej umieszczonej na zakrętce butelki.

Zażycie większej niż zalecana ilości leku DROSETUX[®] syrop

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zażycia leku DROSETUX[®] syrop

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku DROSETUX[®] syrop

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane.

Jak każdy lek, DROSETUX[®] syrop, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, należy zaprzestać stosowania leku i powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. Jak przechowywać lek DROSETUX[®] syrop?

Brak specjalnych warunków przechowywania.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku DROSETUX[®] syrop po upływie terminu ważności umieszczonego na kartoniku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6. Inne informacje.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Boiron Sp. z o.o.

ul. Raszyńska 13

05-500 Piaseczno

Tel. 022/702 66 70

Fax. 022/702 66 71

e-mail: informacjaoleku@boiron.pl

Data zatwierdzenia ulotki: 05/2009