

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy zażywać lek STODAL[®] syrop ostrożnie.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują należy skontaktować się z lekarzem.

STODAL[®] **syrop**

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Skład

100 g syropu zawiera:

Substancje czynne leku:

Pulsatilla	6CH	0,95 g
Rumex crispus	6CH	0,95 g
Bryonia	3CH	0,95 g
Ipeca	3CH	0,95 g
Spongia tosta	3CH	0,95 g
Sticta pulmonaria	3CH	0,95 g
Antimonium tartaricum	6CH	0,95 g
Myocardium	6CH	0,95 g
Coccus cacti	3CH	0,95 g
Drosera	TM	0,95 g

Substancje pomocnicze: karmel, kwas benzoesowy, etanol, syrop tolutański, syrop z krzyżownicy, roztwór sacharozy.

Zawartość opakowania: 200 ml syropu.

Podmiot odpowiedzialny

BOIRON SA

20, rue de la Libération

69110 Ste-Foy-lès-Lyon

Francja

Wytwórca

BOIRON SA

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy,

Francja

Spis treści ulotki :

- 1.Co to jest lek STODAL[®] syrop i w jakim celu się go stosuje?
- 2.Informacje ważne przed zażyciem leku STODAL[®] syrop.
- 3.Jak zażywać lek STODAL[®] syrop?
- 4.Możliwe działania niepożądane.
- 5.Jak przechowywać lek STODAL[®] syrop?
- 6.Inne informacje.

1.Co to jest lek STODAL[®] syrop i w jakim celu się go stosuje?

STODAL[®] syrop jest lekiem stosowanym w leczeniu kaszlu różnego pochodzenia, towarzyszącego infekcjom górnych dróg oddechowych.

2.Informacje ważne przed zażyciem leku STODAL[®] syrop.

Kiedy nie zażywać leku STODAL[®] syrop ?

Leku STODAL[®] syrop nie należy zażywać, jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek STODAL[®] syrop ?

Stosowanie leku u dzieci: przed zastosowaniem leku u dzieci do 6 roku życia należy skonsultować się z lekarzem.

Zażywanie leku STODAL[®] syrop z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Zażywanie leku STODAL[®] syrop z jedzeniem i pićm

Brak specjalnych wymagań.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Przy podanym poniżej dawkowaniu wpływ nieistotny.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku STODAL[®] syrop

Lek zawiera 1,74 % v/v etanolu.

5 ml syropu zawiera 0,069 g etanolu i 3,75 g sacharozy.

15 ml syropu zawiera 0,206 g etanolu i 11,25 g sacharozy.

- Przeciwwskazany u osób z chorobą alkoholową.
- Ze względu na zawartość etanolu przed zastosowaniem leku u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub padaczką należy skonsultować się z lekarzem.
- Ze względu na zawartość sacharozy stosować ostrożnie u pacjentów z cukrzycą.
- W przypadku występowania nietolerancji węglowodanów należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.
- Dawkowanie u dzieci poniżej 6 roku życia ustala lekarz.

3. Jak zażywać lek STODAL[®] syrop?

Stosować doustnie.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowane dawkowanie leku STODAL[®] syrop to:

Dorośli: 15 ml syropu 3-5 razy dziennie.

Dzieci powyżej 6 lat: 5 ml syropu 3-5 razy dziennie.

Dzieci do 6 roku życia: wg wskazań lekarza.

Podczas stosowania zaleca się wykorzystanie miarki dozującej umieszczonej na zakrętce butelki.

W przypadku wystąpienia gorączki powyżej 39°C, uporczywego kaszlu, duszności lub innych niepokojących objawów należy skontaktować się z lekarzem.

Zażycie większej niż zalecana ilości leku STODAL[®] syrop

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zażycia leku STODAL[®] syrop

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku STODAL[®] syrop

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane.

Jak każdy lek, STODAL[®] syrop, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, należy zaprzestać stosowania leku i powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. Jak przechowywać lek STODAL[®] syrop?

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku STODAL[®] syrop po upływie terminu ważności umieszczonego na kartoniku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6. Inne informacje.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Boiron Sp. z o.o.

ul. Raszyńska 13

05-500 Piaseczno

Tel: 022/ 702 66 70

Fax: 022/ 702 66 71

e-mail: informacjaoleku@boiron.pl

Data zatwierdzenia ulotki: 09/2010