

Flegamina Junior syrop o smaku truskawkowym 120 ml



Cena: 9,49 PLN

Opis słownikowy

Postać	Syropy
Producent	PLIVA KRAKÓW
Promocje	Wybrane dla Ciebie
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Bromhexinum

Opis produktu

Skład

- 5 ml (1 łyżka miarowa) syropu zawiera 2 mg bromoheksyny chlorowodorku (Bromhexini hydrochloridum).
- Substancje pomocnicze: kwas cytrynowy jednowodny, glukoza, metylu parahydroksybenzoesan, aromat truskawkowy, koszenila w postaci 7,5% roztworu barwnika, woda oczyszczona

Wskazania i działanie

Ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych przebiegające z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na bromoheksynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą.
- Stosowanie u dzieci poniżej dwóch lat, ze względu na zawartość bromoheksyny.

Dawkowanie

Od 2 do 6 lat: 10 ml 2 razy na dobę

Od 6 do 12 lat: 10 ml 3 razy na dobę

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 20 ml 3 razy na dobę

Działania niepożądane

W związku ze stosowaniem bromoheksyny, sporadycznie mogą wystąpić działania niepożądane żołądkowo-jelitowe, jak również przemijające podwyższenie wartości aminotransferaz w surowicy. Do innych zgłaszanych działań niepożądanych należą ból głowy, zawroty głowy, pocenie się, wysypki skórne. Inhalacje bromoheksyna wywoływały sporadycznie skurcz oskrzeli u podatnych pacjentów.