

## Nasivin 0,01% krople 5 ml



Cena: 16,40 PLN

### Opis słownikowy

Postać	Krople
Producent	PROCTER & GAMBLE
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Oxymetazolini hydrochloridum

### Opis produktu

#### Skład

Substancja czynna: 1 ml roztworu wodnego zawiera 0,1 mg chlorowodoru oksymetazoliny.

#### Wskazania i działanie

- Obrzęk błony śluzowej nosa występujący w przebiegu ostrego nieżytu nosa, naczynioruchowego lub alergicznego nieżytu nosa, zapalenia zatok przynosowych, zapalenia trąbki słuchowej, zapalenia ucha środkowego.

Sympatykomimetyk działający na receptory  $\alpha$ -adrenergiczne. Zwęża naczynia krwionośne, zmniejsza przekrwienie i obrzmienie błony śluzowej nosa, ułatwiając oddychanie. Skurcz naczyń krwionośnych błony śluzowej nosa prowadzi także do rozszerzenia i udrożnienia przewodów odprowadzających zatok przynosowych oraz oczyszczenia trąbki słuchowej. Działanie preparatu jest szybkie i długotrwałe.

#### Dawkowanie

Niemowlęta: noworodki 2-3 razy dziennie po 1 kropli 0,01% roztworu do każdego otworu nosowego; 2-12 m.ż.: 2-3 razy dziennie po 1-2 krople 0,01% roztworu do każdego otworu nosowego.

Nieżyt nosa wysychający, nadwrażliwość na oksymetazolinę lub pozostałe składniki preparatu. Preparatu Nasivin soft 0,01% nie należy stosować u niemowląt do ukończenia 3 m.ż.; preparatu Nasivin soft 0,025% - u niemowląt do ukończenia 1 r.ż., a preparatu Nasivin soft 0,05% - u dzieci do ukończenia 6 r.ż. Bezpieczeństwo stosowania w ciąży: kategoria C (wg US FDA). W ciąży stosować wyłącznie w przypadku, gdy przewidywane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Decydując się na stosowanie u kobiety ciężarnej lub w okresie karmienia piersią należy przestrzegać zalecanego dawkowania, gdyż przedawkowanie może zaburzać transport krwi do płodu oraz hamować laktację. Nie stosować dłużej niż przez 3-5 dni.