


## Undofen Amorolfina leczniczy lakier do paznokci 2,5 ml



Cena: 46,55 PLN

### Opis słownikowy

Postać	Płyny na skórę
Producent	OMEGA PHARMA
Promocje	Wybór Farmaceuty
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Amorolfinum

### Opis produktu

#### Skład

Substancją czynną leku jest amorolfina. Jeden mililitr lakieru zawiera 50 mg amorolfiny (co odpowiada 55,74 mg amorolfiny chlorowodoru). -Pozostałe składniki to: amoniowego metakrylanu kopolimer (typ A), triacetyna, butylu octan, etylu octan, etanol bezwodny.

#### Wskazania i działanie

Leczniczy lakier do paznokci **Undofen® Amorolfina**, to produkt zawierający *amorolfinę* o działaniu przeciwgrzybiczym, skierowanym przeciwko szerokiemu spektrum grzybów z grupy dermatofitów, drożdżaków i pleśni .

- Wskazany jest do samodzielnego stosowania w przypadku występowania grzybicy ograniczonej do dwóch paznokci.
- Produkt aplikowany w postaci lakieru na zainfekowaną płytkę paznokcia zapewnia odpowiednią penetrację leku, nawet do głębszych warstw paznokcia, co w efekcie zapewnia mu odpowiednią skuteczność w leczeniu grzybicy paznokci .

#### Przeciwwskazania

Produktu Undofen® Amorolfina, 50 mg/ml, lakier do paznokci leczniczy nie wolno ponownie stosować u pacjentów, którzy wykazali nadwrażliwość na leczenie. Nadwrażliwość na substancję czynną (amorolfinę) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

#### Dawkowanie

Lakier do paznokci nakłada się na powierzchnię chorych paznokci u rąk lub stóp jeden raz w tygodniu. Aplikacja 2 razy w tygodniu może okazać się korzystna w niektórych przypadkach.

- Pacjent powinien nałożyć lakier na paznokcie jak opisano poniżej:
  - 1. Przed pierwszym nałożeniem produktu Undofen Amorolfina, 50 mg/ml, lakier do paznokci leczniczy, ważne jest aby zakażone części paznokcia (zwłaszcza powierzchnię paznokcia) spiłować bardzo dokładnie za pomocą pilnika. Następnie powierzchnię paznokcia należy oczyścić i odłuszczyć stosując wacik nasączony alkoholem. Przed powtórnym

nałożeniem produktu Undofen Amorolfina, 50 mg/ml, lakier do paznokci leczniczy, zakażone paznokcie należy w zależności od potrzeb, ponownie opłówać, a następnie oczyścić wacikiem w celu usunięcia wszelkich pozostałości lakieru.

**Ostrzeżenie:** pilników stosowanych do chorych paznokci nie wolno używać do paznokci zdrowych.

- 2. Jedną z dostarczonych wielorazowych szpatełek, nałożyć lakier do paznokci na całą powierzchnię chorego paznokcia. Pozostawić do wyschnięcia przez 3-5 minut. Po użyciu, oczyścić szpatełkę tym samym wacikiem, którym wcześniej oczyszczono paznokieć.

**Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą.**

- W celu nałożenia lakieru na każdy leczony paznokieć, zanurzyć szpatełkę w lakierze bez wycierania lakieru o szyjkę butelki.

**Ostrzeżenie:** podczas pracy z rozpuszczalnikami organicznymi (rozcieńczalniki, benzyna lakowa, itp.) należy nosić nieprzepuszczalne rękawice w celu ochrony produktu **Undofen Amorolfina**, 50 mg/ml, lakier do paznokci leczniczy na paznokciach.

- Leczenie należy kontynuować bez przerwy, aż do czasu regeneracji paznokci i całkowitego wyleczenia zaatakowanych chorobą powierzchni. Wymagana częstość aplikacji i czas trwania leczenia zależą głównie od nasilenia i lokalizacji zakażenia. Ogólnie jest to 6 miesięcy (paznokcie u rąk) i 9-12 miesięcy (paznokcie u stóp).
- Ocena skuteczności leczenia zalecana jest w odstępach około 3 miesięcznych.
- Współistniejąca grzybica stóp powinna być leczona odpowiednim kremem przeciwgrzybiczym.

#### **Pacjenci w podeszłym wieku**

Brak specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku.

#### **Dzieci i młodzież**

Produkt Undofen Amorolfina, 50 mg/ml, lakier do paznokci leczniczy nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży, z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa lub skuteczności.

#### **Sposób podawania**

Podanie na powierzchnię paznokcia.

#### **Działania niepożądane**

- Działania niepożądane występują rzadko.
- Mogą wystąpić zaburzenia paznokci (np. przebarwienia paznokci, łamanie się paznokci, kruchość paznokci). Te reakcje mogą być związane z samą grzybicą paznokci.
- Działania niepożądane sklasyfikowano według częstości występowania oraz według układów i narządów.
- Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko ( $\geq 1/10\ 000$  do  $< 1/1\ 000$ )

- Zaburzenia płytki paznokciowej, zmiany barwy płytki paznokciowej, łamliwość paznokci

(onychoclasis), nadmierna kruchość paznokci z ich rozwarstwianiem się (onychorrhexis).

Bardzo rzadko ( $< 1/10\ 000$ )

- Uczucie pieczenia skóry.

Częstość nieznana

- Rumień, świąd, zapalenie kontaktowe skóry, pokrzywka, pęcherz skórny